

## \*肝硬化:

肝硬化會併發食道靜脈瘤，治療食道靜脈瘤，防止再吐血的方法：

1) Procil: 50mg, 一天一次~一天兩次~一天三次~一天四次  
(依病人心跳來決定一天幾次,重點是不可使心跳少於每分鐘65次)

2) Inderal(Propranolol):

10mg, 一天一次~一天兩次~一天三次~一天四次  
(依病人心跳來決定一天幾次,重點是不可使心跳少於每分鐘65次)  
(如病人有氣喘之病史,不可使用Inderal,必須將Inderal更改成

Tenormin 50mg, 一天一次~一天兩次~一天三次  
(依病人心跳來決定一天幾次,重點是不可使心跳少於每分鐘65次)

※ 詳細參考:林松洲編著,肝炎病毒及肝疾患,第二版

如病人有食道靜脈瘤破裂引起的吐血,務必立即掛急診住院,做食道靜脈瘤結紮,否則會立即死亡

肝硬化病人,氨基酸平衡會亂掉,所以一定要 靜脈點滴Aminoleban  
Aminoleban(大塚製藥)一瓶500cc:每天點滴一瓶,連續點滴30瓶

如果已是很嚴重的肝硬化,務必每天靜脈點滴以下3種:

jGlucuronsan(大塚製藥) 一瓶500cc  
+ kMethionine(中國化學) 一瓶20cc  
+ lJetepar(大統製藥) 一瓶10cc  
j+k+l:3種混合在一起(將k及l加入j內),靜脈點滴,  
一天內連續兩瓶j+k+l,連續點滴30天

如果血中氨太高,有昏睡現象:

Eucol發泡錠:一次一粒,放在一碗溫水內,待氣泡消失後,將水喝下,一天三次

## \*腹水:

如已有腹水產生:

※使腹水消失的方法:

(千萬不可直接抽腹水法)

必需以25%的白蛋白(Albumin)一瓶50cc,每天直接以原液靜脈點滴一瓶,連續點滴12天

※應同時併用中藥療法使白蛋白拉高,腹水消失:

黃耆18片、當歸3片、枸杞適當量、紅棗8個,甘草3片  
每天用電鍋燉煮,當茶喝,如果加魚或加排骨也可以將白蛋白(Albumin)拉高到3.3以上

詳細請參考我寫的自然療法專書,第二版,49頁

如有黃膽出現:

黃膽之改善:

1) Cospanon 40 mg/粒,一次2粒,一天三次,三餐後,連續吃100粒  
2) 甲殼素:一次2粒,一天三次,三餐後,長期服用

## \*肝癌:沙棘+蜂膠+黃連解毒湯+淫羊藿+補中益氣湯